

# Brassica oleracea



# Brassica oleracea



## Plantperiode kasteelt

Voor een kasteelt met voorjaars oogst planten in week 5 t/m 12. Voor een kasteelt met najaar oogst, planten in week 28 t/m 34. Door lage temperaturen gaat de kool kleuren.

## Plantperiode buitenteelt

Met een pluggenteelt kan Brassica direct gezaaid worden v.a. week 18-22. Onder gunstige omstandigheden kan al in augustus worden geoogst. De grondsoort speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de optimale plantperiode. Op lichtere gronden kunt u later planten. Voor zowel kas- als vollegrondsteelt geldt 50-72 planten per bruto m<sup>2</sup>. Bij direct zaaien moeten 100-110 zaden/m<sup>2</sup> gezaaid worden.

## Watergift

Voor een goede weg groei voldoende water geven bij de start van de teelt. Wel afhankelijk van de grondsoort proberen om na half september geen water meer te geven. Dit voorkomt problemen met allerlei wortelziektes.

## Bemesting

Voor aanvang van de teelt moet er een voorraadbemesting met een kleine hoeveelheid stikstof (N) worden meegegeven. Later in de teelt bijmesten met Kali-houdende meststoffen. Hoge stikstofcijfers vertragen het kleuringproces.

## Ziektes en plagen

In de teelt van Brassica kunnen koolvlieg, rupsen, tripsen, luis, knolvoet, Sclerotinia, valse en echte meeldauw voorkomen.

## Diversen

Er zijn vele teeltmethoden en varianten bekend. Zowel binnen als buiten moet er gaas gebruikt worden. Neem voor verdere informatie contact op met uw vertegenwoordiger/teeltadviseur.

**Bovenstaande adviezen zijn geheel vrijblijvend en Evanthia B.V. kan hiervoor dan ook niet aansprakelijk worden gesteld.**



## Planting period greenhouse

When growing in a greenhouse with the aim to harvest in spring, plant between weeks 5 and 12. When growing under glass for harvest in autumn, plant in weeks 28 to 34. The drop in temperature will cause the cabbage to colour.

## Planting period outdoors

With plug culture Brassica direct sowing can take place from week 18-22. Under favourable conditions, it is possible to harvest as early as August. The type of soil plays an important part in determining the optimum planting period. Lighter soils allow you to plant later. In both greenhouse as well as outdoor production 50-72 plants per m<sup>2</sup> gross are standard. With direct sowing 100-110 seeds/m<sup>2</sup> can be used.

## Irrigation

For good plant development, water the plants sufficiently at the start of cultivation. Depending on soil type however, do try to avoid watering from September onwards. This prevents problems with all kind of root diseases.

## Fertilization

Before starting cultivation, it is necessary to provide a base dressing including a small amount of nitrogen (N). Later on in the culture you can supplement with fertilizers that contain potash. High nitrogen quantities delay the colouring process.

## Pests and diseases

The production of Brassica may involve pests such as cabbage butterflies, caterpillars, thrips, aphids, clubroot, Sclerotinia and downy mildew and powdery mildew.

## Various

Many production methods and variations are known. For indoor as well for outdoor culture the use of netting is needed. For more information, please contact your dealer/cultivation adviser.

**The advice given above is entirely free of obligations and Evanthia B.V. does not bear any responsibility nor accepts any claims.**